

Instrucciones De Cuidados Posteriores

Instrucciones Postoperatorias

- **Supervisa a tu mascota y la incisión:** Revisa el área quirúrgica diariamente para detectar enrojecimiento, hinchazón o secreción.
- Cuando lleves a tu mascota a casa, durante las primeras 24 horas colócala en una habitación tranquila o en un área protegida para que pueda recuperarse de la cirugía. Especialmente en el caso de las hembras.
- **Alimento y agua:** Por favor, no le des a tu mascota comida ni agua durante las primeras 2 horas después de llegar a casa. Despues de este tiempo está bien ofrecerle un poco de agua. No le des comida porque probablemente vomitará. A la mañana siguiente, aliméntala como de costumbre.

- Si tu mascota vomita cuando llegues a casa, no te preocupes. Esto se debe a la anestesia.

Limita la actividad: Mantén a tu mascota tranquila y evita que salte o corra durante aproximadamente 10 a 14 días.

- No bañarlo ni permitirle nadar durante dos semanas después de la cirugía.
- No subir escaleras ni trepar durante una semana después de la cirugía.
- No permitas que tu mascota juegue con niños durante unos días.
- Si tu mascota vomita cuando llegues a casa, no te preocupes. Esto se debe a la anestesia.

No lamer: Si notas que tu mascota se lame el área de la incisión, utiliza un cono o un corsé para evitar que lo haga.

Si el área quirúrgica necesita ser limpiada

- Usa jabón y agua
- Yodo diluido al 50% con agua (no en gatos)
- Preferido: Microdacin
- Procura no mojar las suturas. Si se mojan, asegúrate de secarlas bien

Medicamento – A tu mascota se le ha aplicado una inyección de antibiótico y una inyección para el dolor. Se te indicará si hay medicamentos adicionales que debas administrar.

No vacunas: Por favor, no le apliques ninguna vacuna a tu mascota durante las 2 semanas posteriores a la cirugía.

Si notas algún problema, como una infección, por favor contáctanos de inmediato. Envía una foto del área por WhatsApp al 333-247-6944.

** *Tu mascota tampoco debe recibir ninguna vacuna durante las 3 semanas previas a la cirugía ni en las dos semanas posteriores.*